

Calendário de Vacinação de zero a 19 anos

VACINAS
SALVAM
VIDAS.



Previna doenças e sofrimentos.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
ao nascer	BCG - ID	dose única	Formas graves de Tuberculose
	Vacina contra Hepatite B (1)	1ª dose	Hepatite B
2 meses	PVC10 (Vacina Pneumocócica 10-Valente)	1ª dose	Pneumonia, Meningites, Otites, Sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina
	VIP (Vacina vírus inativo contra Pólio)	1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)

(1) A primeira dose da vacina contra a Hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12-24 horas de vida do recém-nascido, para prevenir Hepatite crônica, e mais 2 a 3 doses posteriormente (aos 2, 4 e 6 meses de idade). Essas doses seguintes poderão ser aplicadas nas formulações combinadas (Hexavalente, na rede privada, ou Pentavalente celular, na rede pública) ou isoladamente.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
2 meses	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) (3)	1ª dose	Diarréia por Rotavírus
	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + Hep B) (2)	1ª dose	Difteria, Coqueluche, Tétano, Hepatite B Meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus Influenzae tipo B
3 meses	Meningo C (Vacina Meningocócica C conjugada)	1ª dose	Meningite Meningocócica tipo C

(2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Pentavalente e dois reforços com a Tríplíce Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos. (3) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida).

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
4 meses	VIP (Vacina vírus inativo contra Pólio)	2ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) (4)	2ª dose	Diarréia por Rotavírus
	PVC10 (Vacina Pneumocócica 10-Valente)	2ª dose	Pneumonia, Meningites, Otites, Sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina
	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + Hep B) (2)	2ª dose	Difteria, Coqueluche, Tétano, Hepatite B Meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus Influenzae tipo B

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias, a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
5 meses	Meningo C (Vacina Meningocócica C conjugada)	2ª dose	Meningite Meningocócica tipo C
6 meses	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + Hep B) (2)	3ª dose	Difteria, Coqueluche, Tétano, Hepatite B Meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus Influenzae tipo B
	VIP (Vacina vírus inativo contra Pólio)	3ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
9 meses	Vacina Febre Amarela (5)	dose única	Febre Amarela

(5) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão viajar (vacinar 10 dias antes) para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG).

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
12 meses (1 ano)	SRC (tríplice viral)	1ª dose	Sarampo, Rubéola e Caxumba
	Meningo C (Vacina Meningocócica C conjugada)	reforço	Meningite Meningocócica tipo C
	PVC10 (Vacina Pneumocócica 10-Valente)	reforço	Pneumonia, Meningites, Otites, Sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina
15 meses (1 ano e 3 meses)	VOP (Vacina oral contra Pólio)	1º reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	DTP (tríplice bacteriana)	1º reforço	Difteria, Tétano e Coqueluche
	SRC + Varicela (tríplice viral)	dose única	Sarampo, Rubéola, Caxumba e Varicela
	Vacina Hepatite A	dose única	Hepatite A

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
4 a 6 anos	DTP (tríplice bacteriana)	2º reforço	Difteria, Tétano e Coqueluche
	Vacina Varicela	2ª dose	Varicela
	Vacina Febre Amarela	reforço	Febre Amarela
	VOP (Vacina oral contra Pólio)	2º reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
9 a 14 anos	Papilomavírus Humano (HPV)	são 2 dose (a 2ª tomar 6 meses após a 1ª dose)	Papiloma Vírus Humano e que causa Câncer e Verrugas Genitais.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
11 e 12 anos	Meningocócica ACWY	dose única	Doença Meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y
11 a 19 anos	Vacina contra Hepatite B (recombinante)	3 doses (conforme data da 1ª dose)	Hepatite B
	Dupla Bacteriana Adulto (DT)	1 dose a cada 10 anos	Tétano e Difteria
	SRC (tríplice viral)	2 doses (conforme data da 1ª dose)	Sarampo, Rubéola e Caxumba
	Febre Amarela atenuada	dose única	Febre Amarela

VACINAS
SALVAM
VIDAS.

Previna doenças e sofrimentos.



www.comoconseguirpelosus.com.br

